

1. Что относится к отходам класса Б?
 - 1) Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств
 - 2) Мусор из палат, с сестринских постов, ординаторских
 - 3) Отходы больничного пищеблока
 - 4) Отходы бактериологических лабораторий
2. К внешнему признаку ощущения пациентом боли относится
 - 1) напряженный лоб с появлением на нем глубоких морщин
 - 2) прекращение приема пищи
 - 3) отказ от общения
 - 4) заторможенность
3. «Золотым» стандартом кожных антисептиков являются
 - 1) гелеобразные
 - 2) анионные
 - 3) спиртовые
 - 4) водные
4. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) развиваются только при наличии
 - 1) источника инфекции
 - 2) источника инфекции и восприимчивого человека
 - 3) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
 - 4) источника инфекции, механизмов и факторов передачи
5. Какова цель стерилизации?
 - 1) обеспечивает гибель в стерилизуемых изделиях вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов
 - 2) уничтожение насекомых
 - 3) уничтожение крыс
 - 4) уничтожение патогенных микроорганизмов
6. Кома при передозировке инсулина
 - 1) гипергликемическая
 - 2) гипогликемическая
 - 3) уремическая
 - 4) кетоацидотическая
7. Эвтаназия – это
 - 1) введение пациента в медицинскую кому
 - 2) искусственное прекращение жизни по желанию пациента
 - 3) естественная смерть
 - 4) отказ от лечения
8. Тара, которая допускается для сбора отходов класса Б
 - 1) одноразовые пакеты желтого цвета
 - 2) бумажные мешки синего цвета
 - 3) мягкая полимерная тара черного цвета
 - 4) твердая картонная тара
9. Гериатрия – это
 - 1) раздел, изучающий болезни и методы их лечения у пожилых пациентов
 - 2) наука о старении
 - 3) раздел медицины, изучающий профилактику старческих заболеваний
10. Риск микробного заражения у медперсонала возникает при контакте с инфицированными
 - 1) стерильными медицинскими изделиями
 - 2) пациентами, секретами и выделениями пациентов, ранами и повязками

- 3) лекарственными препаратами, уборочным оборудованием
11. Чрезвычайная ситуация локального уровня, если число пострадавших
- 1) 50-500 человек
 - 2) 1-10 человек
 - 3) более 500 пострадавших
 - 4) 10-50 человек
12. Заболевание, не относящееся к группе кишечных инфекций:
- 1) Дизентерии
 - 2) Сальмонеллеза
 - 3) Холеры
 - 4) вирусного гепатита С
13. Для исследования удаленного клеща направление оформляют в
- 1) микробиологическую лабораторию
 - 2) бактериологическую лабораторию
 - 3) биохимическую лабораторию
 - 4) клиническую лабораторию
14. Уборка процедурного кабинета, которая проводится 1 раз в 7 дней, в фиксированный день, по графику работы кабинета называется
- 1) текущая
 - 2) генеральная
 - 3) профилактическая
 - 4) поддерживающая
15. Цвет кожных покровов при желтухе
- 1) иктеричный
 - 2) бледный
 - 3) цианотичный
 - 4) гиперемированный
16. В первые дни при остром инфаркте миокарда показан режим
- 1) общий
 - 2) палатный
 - 3) строгий постельный
 - 4) постельный
17. Механическая антисептика это
- 1) дренирование раны марлевым тампоном
 - 2) удаление из раны нежизнеспособных тканей
 - 3) промывание раны раствором водорода пероксида
 - 4) наложение давящей повязки
18. Тест полоски на наличие кетоновых тел в моче используют при подозрении на
- 1) мочекаменную болезнь
 - 2) гломерулонефрит
 - 3) сахарный диабет
 - 4) цистит и уретрит
19. Живые вакцины подлежат хранению:

- 1) в термостате
 - 2) в холодильнике
 - 3) на складе при комнатной температуре
 - 4) в барокамере
20. Основная жалоба при обструктивном бронхите
- 1) недомогание
 - 2) одышка
 - 3) боль в области груди
 - 4) выделение мокроты
21. При сердечно-сосудистых заболеваниях для профилактики тромбообразования применяют лекарственный препарат
- 1) нитроглицерин
 - 2) парацетамол
 - 3) ацетилсалициловую кислоту
 - 4) ибупрофен
22. Этап медицинской эвакуации означает
- 1) медицинские организации, развернутые и работающие на путях эвакуации
 - 2) участок от места ранения до ближайшей больницы
 - 3) все медицинские организации вблизи очага катастрофы
 - 4) участок пути между медицинскими организациями, в которых оказывается медицинская помощь пострадавшим
23. Первичный морфологический элемент
- 1) трещина
 - 2) пятно
 - 3) лихенизация
 - 4) рубец
24. Покраснение кожных покровов наблюдается при
- 1) отравлении угарным газом
 - 2) острой печеночной недостаточности
 - 3) острой почечной недостаточности
 - 4) алкогольной интоксикации
25. Метеоризмом называют
- 1) спастические боли в кишечнике
 - 2) патологическое газообразование в кишечнике
 - 3) диарея
 - 4) задержку стула более 48 часов
26. Оптимальным сроком оказания первой помощи пострадавшим принято считать с момента поражения
- 1) 6 часов
 - 2) 3 часа
 - 3) 1 час
 - 4) 20-30 минут
27. Образованию пролежней наиболее подвержен
- 1) Ягодичные мышцы

- 2) предплечье
 - 3) крестец
 - 4) грудная клетка
28. Помощь пациенту с легочным кровотечением вовремя до госпитального периода
- 1) измерение температуры
 - 2) введение сосудосуживающих средств
 - 3) подготовка набора для плевральной пункции
 - 4) холод на грудную клетку
29. Температура воды для применения пузыря со льдом должна быть ___ градусов:
- 1) 0
 - 2) 20-22
 - 3) 5-7
 - 4) 12-14
30. Прививки против гриппа проводят
- 1) выезжающим за границу страны
 - 2) больным гриппом
 - 3) переболевшим гриппом
 - 4) при угрозе эпидемии гриппа
31. Метод Геймлиха применяется для оказания первой помощи
- 1) при инспираторной одышке
 - 2) при попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути
 - 3) при астматическом статусе
 - 4) при травме позвоночника
32. Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство оформляется
- 1) при поступлении в клинику
 - 2) перед медицинским вмешательством
 - 3) после первичного осмотра врачом
 - 4) после постановки диагноза
33. На первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения проводится
- 1) осмотр специалиста
 - 2) анкетирование
 - 3) сбор анамнеза
 - 4) консультация врача хирурга
34. Уборка процедурного кабинета, которая проводится в конце рабочего дня называется
- 1) генеральная
 - 2) заключительная
 - 3) текущая
 - 4) предварительная
35. Шок при множественных переломах
- 1) кардиогенный
 - 2) анафилактический
 - 3) травматический
 - 4) гемотрансфузионный

36. Признаки правильно наложенного кровоостанавливающего жгута
- 1) подъем артериального давления и исчезновения пульса
 - 2) чувство онемения в конечности
 - 3) прекращение кровотечения и онемение конечности
 - 4) прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферии конечности
37. В случае педикулеза на титульном листе медицинской карты ставят обозначение
- 1) «Р+»
 - 2) «П+»
 - 3) «pd»
 - 4) «ПД+»
38. Сифонная клизма применяется при
- 1) для местного воздействия на слизистую прямой кишки
 - 2) терапии состояния обтурации (запора)
 - 3) перед постановкой лекарственной клизмы
 - 4) введения питательных веществ
39. Цель дезинфекции рук медперсонала после инфекционного контакта
- 1) создание продолжительной стерильности
 - 2) удаление бытового загрязнения
 - 3) профилактика профессионального заражения
 - 4) обеспечение кратковременной стерильности
40. Признаки полной обструкции дыхательных путей вследствие попадания инородного тела
- 1) жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях
 - 2) надрывной кашель, попытка говорить
 - 3) шумное дыхание, кашель
 - 4) невозможность говорить, кашлять, дышать
41. К числу важнейших профилактических мероприятий относится
- 1) запрет полового воспитания для детей школьного возраста
 - 2) участие в хосписном движении, волонтерстве
 - 3) пропаганда здорового образа жизни
 - 4) создание и функционирование сети центров медицинской профилактики
42. Комплекс мероприятий, направленных на очищение дыхательных путей от слизи и мокроты
- 1) постановка горчичников на грудную клетку
 - 2) лечебная физкультура
 - 3) постуральный дренаж
43. Анатомическая область введения вакцины БЦЖ:
- 1) граница верхней и средней трети наружной поверхности плеча
 - 2) граница верхней и средней трети внутренней поверхности плеча
 - 3) наружная поверхность предплечья
 - 4) внутренняя поверхность предплечья
44. Формированию вторичных половых признаков у мальчиков способствует гормон
- 1) тироксин
 - 2) адреналин
 - 3) тестостерон

- 4) инсулин
45. Целью социальной обработки рук медперсонала перед осмотром пациента является
- 1) удаление бытового загрязнения
 - 2) профилактика профессионального заражения
 - 3) создание кратковременной стерильности
46. При выявлении педикулёза пациента направляют к врачу
- 1) инфекционисту
 - 2) педиатру
 - 3) дерматологу
 - 4) аллергологу
47. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения это
- 1) состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности
 - 2) состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов
 - 3) образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья
48. Осложнение при ингаляционном применении глюкокортикоидов
- 1) лунообразное лицо
 - 2) кандидоз полости рта
 - 3) стероидная язва
 - 4) стероидный диабет
49. При любом инфекционном заболевании необходимо прежде всего провести дезинфекцию
- 1) одежды больного
 - 2) выделений больного
 - 3) посуды больного
 - 4) постельного белья
50. Шок при острой массивной кровопотере
- 1) гемотранфузионный
 - 2) кардиогенный
 - 3) гиповолемический
 - 4) септический
51. При легочном кровотечении медицинской сестре необходимо
- 1) усадить больного
 - 2) обеспечить больному полный покой
 - 3) провести оксигенотерапию
 - 4) вызвать врача
52. Стратегия вторичной профилактики характеризуется
- 1) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска
 - 2) снижением смертности
 - 3) воздействием через средства массовой информации
 - 4) ранней диагностикой заболеваний

53. При попадании биологической жидкости на слизистую медицинской сестре она должна:
- 1) промыть водой и продолжить работу, сообщив после старшей м\с
 - 2) срочно сообщить эпидемиологу и обработать спиртовым раствором
 - 3) промыть водой, обработать спиртовым раствором и сообщить старшей м\с
 - 4) прекратить работу, принять меры в соответствии с инструкцией, сообщить заведующему отделению
54. Сестринская помощь при кровотечении из бедренной артерии
- 1) применение гемостатической губки
 - 2) тампонада раны
 - 3) наложение артериального жгута выше места повреждения
 - 4) наложение давящей повязки
55. Достоверным признаком клинической смерти являются
- 1) отсутствие пульса на лучевой артерии
 - 2) изменение величины зрачков
 - 3) отсутствие сознания
 - 4) отсутствие дыхания, сознания и пульса на сонной артерии
56. Катетеризация мочевого пузыря у мужчин металлическим катетером выполняется
- 1) старшей медсестрой
 - 2) только медсестрой
 - 3) медсестрой и врачом
 - 4) врачом
57. Показанием к катетеризации мочевого пузыря является
- 1) недержание мочи
 - 2) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
 - 3) острая задержка мочи более 6-ти часов
 - 4) появление отеков
58. Использование медицинских масок во всех отделениях стационара обязательно
- 1) на усмотрение эпидемиолога
 - 2) в период эпидемиологического неблагополучия
 - 3) на усмотрение администрации
 - 4) постоянно
59. Диастолическим давлением называется
- 1) артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца
 - 2) разница между систолическим и диастолическим давлением
 - 3) давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тону во время расслабления желудочков сердца
 - 4) сумма систолического и диастолического давления
60. Для сифонной клизмы взрослому следует приготовить чистую воду (в л)
- 1) 3
 - 2) 0,5
 - 3) 1
 - 4) 10 -12

61. Фактором, провоцирующим гипертонический криз, является
- 1) переохлаждение
 - 2) небольшая постоянная физическая нагрузка
 - 3) гиподинамия
 - 4) чрезмерное употребление крепких алкогольных напитков
62. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, относят к классу
- 1) В
 - 2) Г
 - 3) Б
 - 4) А
63. Групповые формы гигиенического воспитания характеризуются общением между:
- 1) Специалистом и группой пациентов
 - 2) Группами специалистов
 - 3) Специалистом и большим количеством пациентов
 - 4) Специалистом и пациентом
64. "состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов" по определению всемирной организации здравоохранения — это
- 1) Диспансеризация
 - 2) Реабилитация
 - 3) Здоровье
 - 4) Профилактика
65. К острым аллергическим реакциям, требующим оказания медицинской помощи в экстренной форме, относится:
- 1) Гипогликемическое состояние
 - 2) Анафилактический шок
 - 3) Гипергликемическое состояние
 - 4) Гипертермический синдром
66. Перед оказанием первой помощи необходимо
- 1) Получить разрешение на ее оказание у пострадавшего
 - 2) Убедиться в собственной безопасности
 - 3) Получить разрешение на ее оказание у родственников пострадавшего
 - 4) Получить разрешение на ее оказание у диспетчера экстренных служб
67. Функциональные обязанности и должностные инструкции медицинских работников разрабатываются работодателем на основе
- 1) Стандартов медицинской помощи
 - 2) Учебников по сестринскому делу
 - 3) Профессиональных стандартов
 - 4) Порядков оказания медицинской помощи
68. Основной причиной развития хронического бронхита является:
- 1) Курение
 - 2) Переохлаждение
 - 3) Гиповитаминоз
 - 4) ОРВИ

69. Основоположницей системы ухода за пациентами является:
- 1) Флоренс Найтингейл
 - 2) Дарья Севастопольская
 - 3) Доротея Орем
 - 4) Екатерина Бакунина
70. Индивидуальная карманная плевательница должна быть заполнена на 1/4 часть раствором
- 1) Гипертоническим
 - 2) Дезинфицирующим
 - 3) Физиологическим
 - 4) Изотоническим
71. Все пациенты, находящиеся на лечении, осматриваются на педикулез каждые __ дней
- 1) 3
 - 2) 14
 - 3) 7
 - 4) 10
72. Для гипертонической клизмы применяют 10% раствор хлорида натрия в объеме ____ мл
- 1) 10-20
 - 2) 200-400
 - 3) 100-200
 - 4) 800-1000
73. Показание к искусственному кормлению через гастростому
- 1) Бессознательное состояние, переломы челюстей
 - 2) Послеоперационный период
 - 3) Непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода
 - 4) Нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса
74. Контроль за количеством выпитой и выделенной жидкости проводится для определения функции
- 1) Селезенки
 - 2) Желудочно-кишечного тракта
 - 3) Почек
 - 4) Печени
75. Для очистительной клизмы необходимо приготовить:
- 1) 100 мл 10% раствора хлорида натрия
 - 2) 10-12 л воды комнатной температуры
 - 3) 1-1,5 л воды комнатной температуры
 - 4) 100-200 мл масляного раствора
76. При наличии отеков медицинская сестра порекомендует пациенту:
- 1) Ограничить прием жидкости и соли
 - 2) Увеличить прием жидкости и соли
 - 3) Увеличить прием белков и жиров
 - 4) Ограничить прием белков и жиров
77. При уходе за гериатрическим пациентом медицинская сестра должна обеспечить
- 1) Безопасность пациента

- 2) Проведение мероприятий личной гигиены
 - 3) Сохранение социальных контактов
 - 4) Рациональное питание пациента
78. Многоцветные медицинские изделия после инвазивных манипуляций подвергаются
- 1) Только предстерилизационной очистке
 - 2) Только стерилизации
 - 3) Дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации
 - 4) Только дезинфекции
79. К осложнениям, связанным с нарушением правил асептики и антисептики при проведении в/м инъекций, относятся:
- 1) Постинъекционные инфильтраты и абсцессы
 - 2) Жировые эмболии
 - 3) Аллергические реакции
 - 4) Воздушные эмболии
80. Устройство, предназначенное для введения в организм лекарственных средств аэрозольным способом – это
- 1) Небулайзер
 - 2) Кислородная лицевая маска
 - 3) Носовая канюля
 - 4) Мешок Амбу
1. Какой наиболее удобный метод дезинфекции инструментария многократного использования?
- 1) химический
 - 2) термический
 - 3) комбинированный
 - 4) механический
2. Кома при передозировке инсулина
- 1) гипергликемическая
 - 2) гипогликемическая
 - 3) уремическая
 - 4) кетоацидотическая
3. Для профилактики пареза кишечника на 2-3 сутки после кесарева сечения нужно применить
- 1) партусистен
 - 2) прогестерон
 - 3) прозерин
 - 4) папазол
4. «экстренное извещение» заполняется при
- 1) установлении числа контактных
 - 2) установлении границ эпидемического очага
 - 3) подтверждении диагноза инфекционного заболевания
 - 4) подозрении на инфекционное заболевание
5. Эвакуация пораженных своим транспортом на этапы медицинской эвакуации вышестоящего звена - это эвакуация
- 1) «от себя»
 - 2) «на себя»
 - 3) «по направлению»
 - 4) «по назначению»

6. Характерный симптом при атеросклерозе артерий нижних конечностей
 - 1) перемежающаяся хромота
 - 2) отеки
 - 3) одышка
7. Геронтология – это наука о
 - 1) профилактике и лечении болезней старческого возраста
 - 2) здоровье женщины
 - 3) смерти
 - 4) старении
8. Медицинская сестра с спо может получить дополнительное последипломное образование (переподготовк по специальностям:
 - 1) «операционное дело» «анестезиология и реаниматология» «диетология»«медицинская статистика» «сестринское дело в педиатрии» «физиотерапия»«сестринское дело в косметологии» «организация сестринского дела»
 - 2) «лечебное дело», «акушерское дело»
 - 3) «управление сестринской деятельностью»
 - 4) «терапия», «хирургия»
9. Риск микробного заражения у медперсонала возникает при контакте с инфицированными
 - 1) стерильными медицинскими изделиями
 - 2) пациентами, секретами и выделениями пациентов, ранами и повязками
 - 3) лекарственными препаратами
10. Шок при инфаркте миокарда
 - 1) кардиогенный
 - 2) травматический
 - 3) анафилактический
 - 4) гемотрансфузионный
11. Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство оформляется
 - 1) после медицинского вмешательства
 - 2) перед медицинским вмешательством
 - 3) после первичного осмотра врачом
 - 4) перед постановкой диагноза
12. Метеоризмом называют
 - 1) спастические боли в кишечнике
 - 2) патологическое газообразование в кишечнике
 - 3) частый жидкий стул
 - 4) задержку стула более 48 часов
13. Основная причина острого гломерулонефрита
 - 1) кандидозная инфекция
 - 2) микобактерии
 - 3) кишечная палочка
 - 4) бета-гемолитический стрептококк группы а
14. Для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду (в л)
 - 1) 3
 - 2) 0,5
 - 3) 1
 - 4) 10
15. «этический кодекс медицинской сестры россии» принят
 - 1) министерством здравоохранения рф
 - 2) всемирной организацией здравоохранения

- 3) международным советом медицинских сестер
- 4) ассоциацией медицинских сестер россии
16. Тара, которая допускается для сбора отходов класса б
 - 1) одноразовые пакеты желтого цвета
 - 2) бумажные мешки синего цвета
 - 3) мягкая полимерная тара черного цвета
 - 4) твердая картонная тара
17. Обязательное медицинское страхование гарантирует
 - 1) получение всеми гражданами рф медицинской помощи определенного объема и уровня
 - 2) бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи
 - 3) получение медицинской помощи минимального объема
 - 4) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности.
18. Сифонная клизма применяется при неопухолевой обтурационной кишечной непроходимости для
 - 1) для местного воздействия на слизистую прямой кишки
 - 2) терапии состояния обтурации (запора)
 - 3) перед постановкой лекарственной клизмы
 - 4) введения питательных веществ
19. Препарат первой помощи при стенокардии
 - 1) нифедипин
 - 2) нитроглицерин
 - 3) каптоприл
 - 4) верапамил
20. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо ограничение соли в сутки до
 - 1) 15 г
 - 2) 10 г
 - 3) 6 г
 - 4) 5 г
21. Какова цель стерилизации?
 - 1) обеспечивает гибель в стерилизуемых изделиях вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов
 - 2) уничтожение насекомых
 - 3) уничтожение крыс
22. При ожирении двигательную активность рекомендуют
 - 1) увеличить
 - 2) уменьшить
 - 3) не изменять
 - 4) исключить
23. Сыпной тиф характеризуется
 - 1) постепенным началом болезни
 - 2) высокой лихорадкой длительностью до 7-10 дней
 - 3) полиаденопатией
 - 4) наличием гепатолиенального синдрома
24. Цвет кожных покровов при желтухе
 - 1) желтушный
 - 2) бледный
 - 3) цианотичный
 - 4) гиперемированный

25. В случае отсрочки оказания первой помощи на время более 6 часов погибает пораженных
- 1) 10%
 - 2) 60%
 - 3) 90%
 - 4) 30%
26. Цель проведения инфузионной терапии
- 1) переливание плазмы
 - 2) поддержание водно-электролитного баланса
 - 3) переливание эритроцитарной массы
 - 4) обезболивание
27. Наиболее эффективным средством контрацепции, защищающим от заболеваний, передающихся половым путем, является
- 1) презерватив
 - 2) гормональные препараты
 - 3) внутриматочная спираль
 - 4) диафрагма
28. Показанием к катетеризации мочевого пузыря является
- 1) недержание мочи
 - 2) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
 - 3) острая задержка мочи более 6-ти часов
 - 4) появление отеков
29. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, относят к классу
- 1) в
 - 2) г
 - 3) б
 - 4) а
30. Костная ткань у детей преддошкольного и дошкольного возраста отличается от костной ткани взрослых
- 1) большей ломкостью
 - 2) большей плотностью
 - 3) большей эластичностью
 - 4) большим содержанием минеральных веществ
31. Заболевание, не относящееся к группе кишечных инфекций:
- 1) дизентерии
 - 2) сальмонеллеза
 - 3) холеры
 - 4) вирусного гепатита в
32. Отходы больничного пищеблока относят к классу
- 1) а (+)
 - 2) г
 - 3) б
33. листок нетрудоспособности выдается
- 1) заболеваниями вне обострения
 - 2) заболевшим лицам, работающим по трудовому договору
 - 3) лицам с хроническими
 - 4) работникам на время прохождения периодических медицинских осмотров
34. Прививки против гриппа проводят
- 1) выезжающим за границу страны
 - 2) больным гриппом
 - 3) переболевшим гриппом

- 4) при угрозе эпидемии гриппа
35. Куда помещают отходы класса а при их сборе?
- 1) в одноразовые пакеты или мешки
 - 2) в вёдра
 - 3) в ящики
36. Кем подписывается отказ от медицинского вмешательства?
- 1) подписывается гражданином, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским работником
 - 2) главным врачом
 - 3) медицинской комиссией
37. Основная жалоба при обструктивном бронхите
- 1) недомогание
 - 2) одышка
 - 3) головная боль
38. Для исследования удаленного клеща направление оформляют в
- 1) микробиологическую лабораторию
 - 2) бактериологическую лабораторию
 - 3) биохимическую лабораторию
 - 4) клиническую лабораторию
39. Помощь пациенту с легочным кровотечением во время догоспитального периода
- 1) измерение температуры
 - 2) введение сосудосуживающих средств
 - 3) подготовка набора для плевральной пункции
 - 4) холод на грудную клетку
40. Помощь пациенту при подозрении на острый аппендицит
- 1) введение анальгетиков
 - 2) введение антибактериальных средств
 - 3) холод на живот, госпитализация
 - 4) грелка на живот
41. Катетеризация мочевого пузыря у мужчин металлическим катетером выполняется
- 1) старшей медсестрой
 - 2) только медсестрой
 - 3) медсестрой и врачом
 - 4) врачом
42. При аварийной ситуации с биологическими жидкостями медицинская сестра должна
- 1) уволиться
 - 2) обратиться к главному врачу
 - 3) поставить в известность старшую медицинскую сестру отделения, заведующего отделением
 - 4) провести текущую уборку процедурного кабинета
43. В случае педикулеза на титульном листе медицинской карты ставят обозначение
- 1) «р»
 - 2) «в-20»
 - 3) «в»
 - 4) «а»
44. Покраснение кожных покровов наблюдается при
- 1) отравлении угарным газом
 - 2) острой печеночной недостаточности
 - 3) острой почечной недостаточности
 - 4) острой массивной кровопотере
45. Фактором, провоцирующим гипертонический криз является
- 1) переохлаждение

- 2) недостаточное питание
 - 3) гиподинамия
 - 4) чрезмерное физическое и психическое перенапряжение
46. На первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения проводится
- 1) консультация врача уролога
 - 2) анкетирование
 - 3) сканирование брахицефальных артерий
 - 4) консультация врача хирурга
47. Больного холерой госпитализируют в
- 1) бокс кишечного инфекционного отделения стационара больницы
 - 2) полубокс отделение детской инфекционной больницы
 - 3) отделение интенсивной терапии соматического стационара
48. Чрезвычайная ситуация локального уровня, если число пострадавших
- 1) 50-500 человек
 - 2) 1-10 человек
 - 3) более 500 пострадавших
 - 4) 10-50 человек
49. Медицинская помощь оказывается
- 1) спасателями с использованием табельных медицинских средств
 - 2) медицинскими работниками с использованием табельных медицинских средств
 - 3) населением с использованием подручных средств
 - 4) медицинскими работниками с использованием подручных средств
50. Признаки правильно наложенного кровоостанавливающего жгута
- 1) падение артериального давления
 - 2) чувство онемения в конечности
 - 3) прекращение кровотечения и онемение конечности
 - 4) прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферии конечности
51. В первые дни при остром инфаркте миокарда показан режим
- 1) общий
 - 2) палатный
 - 3) строгий постельный
 - 4) постельный
52. Нитроглицерин при приступе стенокардии пациент принимает
- 1) сублингвально
 - 2) ректально
 - 3) внутрь
 - 4) подкожно
53. Оптимальным для рождения ребенка считается возраст женщины (__ лет)
- 1) 25-45
 - 2) 30-40
 - 3) 20-25
 - 4) 25-35
54. Алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся
- 1) спастическим параличом конечностей
 - 2) развитием галлюцинаций
 - 3) развитием патологического влечения к спиртным напиткам, формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
 - 4) наличием бреда
55. Анатомическая область введения вакцины бцж:
- 1) граница верхней и средней трети наружной поверхности плеча
 - 2) граница верхней и средней трети внутренней поверхности плеча

- 3) наружная поверхность предплечья
 - 4) внутренняя поверхность предплечья
56. Первичный морфологический элемент
- 1) трещина
 - 2) пустула
 - 3) лихенизация
 - 4) рубец
57. Достоверным признаком клинической смерти являются
- 1) отсутствие пульса на лучевой артерии
 - 2) изменение величины зрачков
 - 3) отсутствие сознания
 - 4) отсутствие дыхания, сознания и пульса на сонной артерии
58. Первое прикладывание к груди здорового новорожденного проводится после рождения
- 1) в первые 30 минут
 - 2) через 6 часов
 - 3) через 2-3 часа
59. Комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов называется
- 1) стерилизация
 - 2) дезинфекция
 - 3) дезинсекция
 - 4) дератизация
60. Тест полоски на наличие кетоновых тел в моче используют при подозрении на
- 1) мочекаменную болезнь
 - 2) гломерулонефрит
 - 3) сахарный диабет
 - 4) цистит и уретрит
61. Наименования должностей, которые может занимать медицинская сестра с базовым уровнем спо по специальности «сестринское дело» включая
- 1) медсестра участковая, патронажная, приёмного отделения, палатная (постовая), перевязочной, процедурной, стерилизационной
 - 2) медицинская сестра по косметологии, физиотерапии, реабилитации
 - 3) главная медицинская сестра
 - 4) медицинская сестра - анестезист, операционная медицинская сестра, диетическая
62. При подозрении на туберкулез пациент направляется в
- 1) кожно-венерологический диспансер
 - 2) противотуберкулезный диспансер
 - 3) пульмонологическое отделение стационара
63. Уборка процедурного кабинета, которая проводится в конце рабочего дня называется
- 1) генеральная
 - 2) заключительная
 - 3) текущая
 - 4) предварительная
64. К числу важнейших профилактических мероприятий относится
- 1) запрет полового воспитания для детей школьного возраста
 - 2) участие в хосписном движении, волонтерстве
 - 3) пропаганда здорового образа жизни
 - 4) создание и функционирование сети центров медицинской профилактики
65. При легочном кровотечении медицинской сестре необходимо
- 1) поставить банки, горчичники
 - 2) обеспечить больному полный покой
 - 3) провести оксигенотерапию

- 4) вызвать врача
66. Формированию вторичных половых признаков у девочек способствует гормон
- 1) тироксин
 - 2) адреналин
 - 3) эстрадиол
 - 4) инсулин
67. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (исмп) развиваются только при наличии
- источника инфекции
 - источника инфекции и восприимчивого человека
 - источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
 - источника инфекции, механизмов и факторов передачи
68. При наружном венозном кровотечении
- 1) кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно
 - 2) кровь алого цвета, вытекает медленно
 - 3) кровь темно-вишневого цвета, бьет струей
 - 4) кровь алого цвета, бьет струей
69. В соответствии с трудовым кодексом рф медицинская сестра обязана проходить повышение квалификации не реже, чем
- 1) 1 раз в 5 лет
 - 2) каждые 2 года
 - 3) 1 раз в 3 года
 - 4) ежегодно
70. Образованию пролежней наиболее подвержен
- 1) висок
 - 2) предплечье
 - 3) крестец
 - 4) грудная клетка
71. Способ транспортировки при ранении в затылок
- 1) в полусидящем положении
 - 2) лежа на животе
 - 3) лежа на боку
 - 4) сидя
72. Метод геймлиха применяется для оказания первой помощи
- 1) при инспираторной одышке
 - 2) при попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути
 - 3) при астматическом статусе
 - 4) при травме позвоночника
73. Неоказание медицинской помощи без уважительной причины человеку, нуждающемуся в ней- это
- 1) должностной подлог
 - 2) преступление
 - 3) злоупотребление служебным положением
 - 4) взяточничество
74. При любом инфекционном заболевании необходимо прежде всего провести дезинфекцию
- 1) одежды больного
 - 2) выделений больного
 - 3) посуды больного
 - 4) постельного белья
75. При выявлении чесотки пациента направляют к врачу

- 1) инфекционисту
 - 2) педиатру
 - 3) дерматологу
 - 4) аллергологу
76. Основное клиническое проявление бронхиальной астмы
- 1) приступ удушья с затрудненным выдохом
 - 2) одышка смешанного характера
 - 3) кашель с выделением пенистой мокроты
77. Чрезвычайная ситуация территориального уровня, если число пострадавших
- 1) 1-10 человек
 - 2) 50-500 человек
 - 3) 10-50 человек
 - 4) более 500 пострадавших
78. Рекомендуемая периодичность профилактического осмотра женщины врачом акушером-гинекологом составляет
- 1) 1 раз в год
 - 2) 2 раза в год
 - 3) 4 раза в год
 - 4) 1 раз в 2 года
79. К лекарственному препарату из группы антибиотиков относится
- 1) натрия фторид
 - 2) лоратадин (кларитин)
 - 3) кларитромицин
 - 4) нандролон (ретаболил)
80. «золотым» стандартом кожных антисептиков являются
- 1) гелеобразные
 - 2) анионные
 - 3) спиртовые
 - 4) водные
-
1. В случае педикулеза на титульном листе медицинской карты ставят обозначение
 - 1) «Р+»
 - 2) «Pd+»
 - 3) «ПД+»
 - 4) «П+»
 2. При подозрении на туберкулез пациент направляется в
 - 1) кожно-венерологический диспансер
 - 2) противотуберкулезный диспансер
 - 3) к фтизиатру в поликлинику
 - 4) пульмонологическое отделение стационара
 3. Шок при множественных переломах
 - 1) кардиогенный
 - 2) анафилактический
 - 3) травматический
 - 4) гемотрансфузионный
 4. Живые вакцины подлежат хранению:
 - 1) в термостате или термосе
 - 2) в холодильнике
 - 3) на складе при комнатной температуре
 - 4) в барокамере
 5. Шприцы, инструменты после использования погружают в ёмкость с
 - 1) дезинфицирующим раствором

- 2) водой с температурой 85-90 градусов
 - 3) с хлорированной водой
6. Отделение профилактики входит в состав
- 1) поликлиники
 - 2) диспансера
 - 3) родильного дома
 - 4) стационара
7. Уборка процедурного кабинета, которая проводится 1 раз в 7 дней, в фиксированный день, по графику работы кабинета называется
- 1) генеральная
 - 2) заключительная
 - 3) окончательная
 - 4) периодическая
8. Отходы больничного пищеблока относят к классу
- 1) а
 - 2) г
 - 3) б
9. Целью социальной обработки рук медперсонала перед осмотром пациента является
- 1) удаление бытового загрязнения
 - 2) профилактика профессионального заражения
 - 3) создание кратковременной стерильности
10. Симптом вывиха
- 1) крепитация костных отломков
 - 2) изменение относительной длины конечности
 - 3) изменение абсолютной длины конечности
 - 4) патологическая подвижность в поврежденном суставе
11. Катетеризация мочевого пузыря у мужчин металлическим катетером выполняется
- 1) старшей медсестрой
 - 2) только медсестрой
 - 3) медсестрой и врачом
 - 4) врачом
12. Шок при острой массивной кровопотере
- 1) гемотранфузионный
 - 2) кардиогенный
 - 3) гиповолемический
 - 4) септический
13. Куда помещают отходы класса А при их сборе?
- 1) в одноразовые пакеты или мешки
 - 2) в специальные вёдра емкостью 10-12 литров
 - 3) в специально оборудованные ящики с последующей утилизацией методом сжигания
14. Тест полоски на наличие кетоновых тел в моче используют при подозрении на
- 1) мочекаменную болезнь
 - 2) гломерулонефрит
 - 3) сахарный диабет
 - 4) цистит и уретрит
15. К наиболее значимым факторам риска развития инсульта, инфаркта миокарда относится:
- 1) вредные привычки (алкоголизм, табакокурение и др)
 - 2) артериальная гипертензия без коррекции лекарственными препаратами
 - 3) низкая физическая активность

- 4) употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жира
16. К числу важнейших профилактических мероприятий относится
 - 1) запрет полового воспитания для детей школьного возраста
 - 2) участие в хосписном движении, волонтерстве
 - 3) пропаганда здорового образа жизни (+)
 - 4) создание и функционирование сети центров медицинской профилактики
17. При постановке масляной клизмы применяют
 - 1) масло с температурой около 35-36 градусов
 - 2) масло в количестве 300-350 мл
 - 3) масло с температурой 18-20 градусов
 - 4) при любой патологии
18. гигиеническая обработка глаз пациенту производится:
 - 1) с помощью марлевых стерильных салфеток
 - 2) применяется теплый масляный раствор
 - 3) используются ватные диски 6-8 штук
 - 4) протираем глаза пациенту сверху вниз, придерживая верхнее веко
19. Компетенция медицинской сестры во время приступа бронхиальной астмы у ребенка до прихода лечащего врача
 - 1) проведение отвлекающих процедур
 - 2) оксигенотерапии
 - 3) введение антибиотиков
 - 4) введение эуфиллина внутривенно
20. «Экстренное извещение» заполняется при
 - 1) установлении числа контактных
 - 2) установлении границ эпидемического очага
 - 3) подтверждении диагноза инфекционного заболевания
 - 4) подозрении на любое инфекционное заболевание
21. Образованию пролежней наиболее подвержены:
 - 1) Пациенты мужского пола
 - 2) Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
 - 3) Пациенты с худощавым телосложением, при кахексии
 - 4) Пациенты с ожирением
22. Для исследования удаленного клеща направление оформляют в
 - 1) микробиологическую лабораторию
 - 2) бактериологическую лабораторию
 - 3) биохимическую лабораторию
 - 4) клиническую лабораторию
23. листок нетрудоспособности выдается
 - 1) Всем заболевшим трудящимся
 - 2) заболевшим лицам, работающим по трудовому договору
 - 3) лицам с хроническими заболеваниями, инвалидам
 - 4) работникам на время прохождения периодических медицинских осмотров
24. Противопоказания к применению согревающей грелки является:
 - 1) ОРВИ в период обострения
 - 2) Наличие фебрильной температуры
 - 3) беременность
 - 4) дети до полугода
25. Формированию вторичных половых признаков у девочек способствует гормон
 - 1) тестостерон
 - 2) адреналин
 - 3) эстрадиол
 - 4) инсулин

26. К внешнему признаку (вербальному) ощущения пациентом боли относится
- 1) Искривление рта в гримасе
 - 2) Закрытые глаза
 - 3) отказ от общения
 - 4) заторможенность
27. Уборка процедурного кабинета, которая проводится медицинским персоналом во время работы с целью удаления загрязнений, возникших в процессе работы называется
- 1) текущая
 - 2) заключительная
 - 3) рабочая
28. На какой срок накладывается жгут
- 1) 6 часов
 - 2) 3 часа
 - 3) 1 час
 - 4) 2 часа
29. Какое обследование пациента является субъективным
- 1) Опрос пациента
 - 2) Рентгенографическое исследование
 - 3) Лабораторное исследование
30. Использование медицинских масок во всех отделениях стационара обязательно
- 1) на усмотрение эпидемиолога
 - 2) в период эпидемиологического неблагополучия
 - 3) на усмотрение администрации
 - 4) постоянно
31. катетер Фолея применяется при:
- 1) длительной катетеризации тяжелобольных пациентов
 - 2) только мужчинам
 - 3) только женщинам
 - 4) для введения лекарственных препаратов в мочевой пузырь (при ирригации мочевого пузыря)
32. Метод Геймлиха применяется для оказания первой помощи
- 1) при отсутствии дыхания
 - 2) при попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути
 - 3) при астматическом статусе
 - 4) при травме позвоночника
33. Что относится к отходам класса Б?
- 1) материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств (+)
 - 2) отходы с любого помещения медицинского учреждения
 - 3) отходы больничного пищеблока
34. Чрезвычайная ситуация локального уровня, если число пострадавших
- 1) 50-500 человек
 - 2) 1-10 человек
 - 3) более 500 пострадавших
 - 4) 10-50 человек
35. Кома при передозировке инсулина
- 1) гипергликемическая
 - 2) гипогликемическая
 - 3) уремическая
 - 4) кетоацидотическая

36. Достоверным признаком клинической смерти являются
- 1) отсутствие пульса на лучевой артерии
 - 2) изменение величины зрачков
 - 3) отсутствие сознания
 - 4) отсутствие дыхания, сознания и пульса на сонной артерии
37. Рекомендуемая периодичность профилактического осмотра женщины врачом акушером-гинекологом составляет
- 1) 1 раз в год
 - 2) 2 раза в год
 - 3) 4 раза в год
 - 4) 1 раз в 2 года
38. При сопоре:
- 1) Пациент реагирует на раздражители
 - 2) Пациент не может самостоятельно дышать
 - 3) Пациент не реагирует на раздражители
 - 4) У пациента отсутствует пульс, дыхание
39. При ступоре
- 1) Пациент заторможен
 - 2) Пациент не реагирует на раздражители
 - 3) Давление резко поднимается
 - 4) Патологический сон
40. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения это
- 1) состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности
 - 2) состояние населения, при котором человек чувствует себя комфортно, способен осуществлять свою трудовую деятельность
41. Анатомическая область введения пробы Манту:
- 1) граница верхней и средней трети наружной поверхности плеча
 - 2) граница верхней и средней трети внутренней поверхности плеча
 - 3) наружная поверхность предплечья
 - 4) внутренняя поверхность предплечья
42. При легочном кровотечении медицинской сестре необходимо
- 1) Положить пациента
 - 2) обеспечить больному полный покой
 - 3) провести оксигенотерапию
 - 4) вызвать врача
43. При любом инфекционном заболевании необходимо прежде всего провести дезинфекцию
- 1) одежды больного
 - 2) выделений больного
 - 3) посуды больного
 - 4) постельного белья
44. При ознобе при лихорадке необходимо:
- 1) Укрыть пациента
 - 2) Дать выпить горячий чай
 - 3) На голову положить пузырь со льдом, завернув в толстое полотенце
45. Сердечная астма – это тяжелое состояние, для которого характерны
- 1) головокружение

- 2) боли за грудиной, иррадиирующие в область левого плеча
 - 3) потеря сознания
 - 4) приступы удушья
46. «Золотым» стандартом кожных антисептиков являются
- 1) гелеобразные
 - 2) анионные
 - 3) спиртовые
 - 4) водные
47. Признаки полной обструкции дыхательных путей вследствие попадания инородного тела
- 1) жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях
 - 2) надрывной кашель, попытка говорить
 - 3) шумное дыхание, кашель
 - 4) невозможность говорить, кашлять, дышать
48. постановка масляной клизмы не осуществляется:
- 1) в пост инфарктном состоянии
 - 2) беременным женщинам на последних сроках
 - 3) при выявлении опухоли в области прямой кишки
 - 4) тяжело больным пациентам в послеоперационном периоде
49. В случае отсрочки оказания первой помощи на время более 6 часов погибает пораженных
- 1) 10%
 - 2) 60%
 - 3) 90%
 - 4) 30%
50. Основное клиническое проявление бронхиальной астмы
- 1) приступ удушья с затрудненным выдохом
 - 2) одышка смешанного характера
 - 3) кашель с выделением пенистой мокроты
51. Какой наиболее удобный метод дезинфекции инструментария многократного использования?
- 1) химический
 - 2) термический
 - 3) комбинированный
 - 4) механический
52. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) развиваются только при наличии
- 1) источника инфекции
 - 2) источника инфекции и восприимчивого человека
 - 3) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
 - 4) источника инфекции, механизмов и факторов передачи
53. Обязательное медицинское страхование гарантирует
- 1) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
 - 2) бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи
 - 3) получение медицинской помощи минимального объема
 - 4) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности.
54. В первые дни при остром инфаркте миокарда показан режим
- 1) общий
 - 2) палатный

- 3) строгий постельный
 - 4) постельный
55. Первое прикладывание к груди здорового новорожденного проводится после рождения
- 1) в первые 30 минут
 - 2) через 6 часов
 - 3) через 2-3 часа
56. Механическая антисептика это
- 1) дренирование раны марлевым тампоном
 - 2) удаление из раны нежизнеспособных тканей
 - 3) промывание раны раствором водорода пероксида
 - 4) наложение давящей повязки
57. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, относят к классу
- 1) в
 - 2) г
 - 3) б
 - 4) а
58. В соответствии с трудовым кодексом РФ медицинская сестра обязана проходить повышение квалификации не реже, чем
- 1) 1 раз в 5 лет
 - 2) каждые 2 года
 - 3) 1 раз в 3 года
 - 4) ежегодно
59. При выявлении чесотки пациента направляют к врачу
- 1) инфекционисту
 - 2) педиатру
 - 3) дерматологу
 - 4) аллергологу
60. Цель проведения инфузионной терапии
- 1) переливание плазмы
 - 2) поддержание водно-электролитного баланса
 - 3) переливание эритроцитарной массы
 - 4) обезболивание
61. Уборка процедурного кабинета, которая проводится в конце рабочего дня называется
- 1) генеральная
 - 2) заключительная
 - 3) текущая
 - 4) предварительная
62. Комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов называется
- 1) стерилизация
 - 2) дезинфекция
 - 3) дезинсекция
 - 4) дератизация
63. Для профилактики метеоризма применяют
- 1) Газоотводную трубку
 - 2) Очистительную клизму
 - 3) диету
 - 4) масляную клизму
64. При отсутствии у пострадавшего сознания и наличии самостоятельного дыхания следует

- 1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
 - 2) подложить пострадавшему под голову валик из одежды
 - 3) подложить валик из одежды под плечи пострадавшего
 - 4) повернуть пострадавшего на бок
65. Характерный симптом при атеросклерозе артерий нижних конечностей
- 1) перемежающаяся хромота
 - 2) отеки
 - 3) одышка
66. Препарат первой помощи при стенокардии
- 1) аспирин
 - 2) нитроглицерин
 - 3) каптоприл
 - 4) верапамил
67. Медицинская помощь при носовом кровотечении
- 1) Запрокинуть голову вверх, приложить холодное в область лба
 - 2) Слегка опустить голову вниз, предложить салфетку смоченную в холодной воде
 - 3) Тампонада носовой полости
68. Сестринская помощь при кровотечении из бедренной артерии
- 1) применение гемостатической губки
 - 2) тампонада раны
 - 3) наложение артериального жгута выше места повреждения
 - 4) наложение давящей повязки
69. Какова цель стерилизации?
- 1) обеспечивает гибель в стерилизуемых изделиях вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов
 - 2) уничтожение видимого мусора
 - 3) обеспечение гибели насекомых, грызунов, грибов и спор
70. Эвтаназия – это
- 1) самоубийство
 - 2) искусственное прекращение жизни по желанию пациента
 - 3) естественная смерть
 - 4) отказ от лечения, введение в медикаментозную кому
71. Оптимальное положение пациента при после обморока
- 1) приподнятый ножной конец
 - 2) полусидя на кушетке
 - 3) сидя на стуле
 - 4) приподнятый головной конец
72. оказание помощи при обмороке
- 1) дать выпить теплого сладкого чая
 - 2) положить пузырь со льдом на область головы
 - 3) опустить ноги вниз
73. Риск микробного заражения у медперсонала возникает при контакте с инфицированными
- 1) стерильными медицинскими изделиями
 - 2) пациентами, секретами и выделениями пациентов, ранами и повязками
 - 3) лекарственными препаратами
74. На первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения проводится
- 1) консультация специалиста
 - 2) анкетирование
 - 3) Флюорография

- 4) консультация врача хирурга
- 75. Метеоризмом называют
 - 1) спастические боли в кишечнике
 - 2) патологическое газообразование в кишечнике
 - 3) частый жидкий стул
 - 4) задержку стула более 48 часов
- 76. основная причина острого гломерулонефрита
 - 1) кандидозная инфекция
 - 2) микобактерии
 - 3) кишечная палочка
 - 4) бета-гемолитический стрептококк группы А
- 77. Чрезвычайная ситуация территориального уровня, если число пострадавших
 - 1) 1-10 человек
 - 2) 50-500 человек
 - 3) 10-50 человек
 - 4) более 500 пострадавших
- 78. Для пузыря со льдом применяют
 - 1) Лед и заполняют на 1/2 пузыря
 - 2) Лед и воду температурой 12-14 градусов
 - 3) Холодную воду
 - 4) Воду температурой 0 градусов
- 79. Прививки против гриппа проводят
 - 1) выезжающим за границу страны
 - 2) больным гриппом
 - 3) переболевшим гриппом
 - 4) при угрозе эпидемии гриппа
- 80. Первичный морфологический элемент
 - 1) трещина
 - 2) пятно
 - 3) лихенизация
 - 4) эрозия
- 1. При аварийной ситуации с биологическими жидкостями медицинская сестра должна
 - 1) поставить в известность главного врача, эпидемиолога, главную медицинскую сестру
 - 2) поставить в известность старшую медицинскую сестру отделения, заведующего отделением
 - 3) провести текущую уборку процедурного кабинета
- 2. Цвет кожных покровов при желтухе
 - 1) Иктеричный
 - 2) Бледный
 - 3) Цианотичный
 - 4) гиперемированный
- 3. Признаки полной обструкции дыхательных путей вследствие попадания инородного тела
 - 1) жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях
 - 2) надрывной кашель, попытка говорить
 - 3) шумное дыхание, кашель
 - 4) невозможность говорить, кашлять, дышать
- 4. Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство оформляется
 - 1) после медицинского вмешательства

- 2) перед медицинским вмешательством
 - 3) после первичного осмотра врачом
 - 4) перед постановкой диагноза
5. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) развиваются только при наличии
- 1) источника инфекции
 - 2) источника инфекции и восприимчивого человека
 - 3) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
 - 4) источника инфекции, механизмов и факторов передач
6. Цель дезинфекции рук медперсонала после инфекционного контакта
- 1) создание продолжительной стерильности
 - 2) удаление бытового загрязнения
 - 3) профилактика профессионального заражения
 - 4) обеспечение кратковременной стерильности
7. Показанием к катетеризации мочевого пузыря является
- 1) недержание мочи
 - 2) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
 - 3) острая задержка мочи более 6-ти часов
 - 4) появление отеков
8. Образованию пролежней наиболее подвержены участки при положении на боку:
- 1) вертел бедренной кости
 - 2) затылок
 - 3) крестец
 - 4) лопатки
9. Уборка процедурного кабинета, которая проводится медицинским персоналом во время работы с целью удаления загрязнений, возникших в процессе работы называется
- 1) текущая
 - 2) заключительная
 - 3) рабочая
10. Обязательное медицинское страхование гарантирует
- 1) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
 - 2) бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи
 - 3) получение медицинской помощи минимального объема
 - 4) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности.
11. Целью социальной обработки рук медперсонала перед осмотром пациента является
- 1) удаление бытового загрязнения
 - 2) профилактика профессионального заражения
 - 3) создание кратковременной стерильности
12. Тара, которая допускается для сбора отходов класса Б
- 1) одноразовые пакеты желтого цвета
 - 2) бумажные мешки синего цвета
 - 3) мягкая полимерная тара черного цвета
 - 4) твердая картонная тара
13. Если пораженные следуют общим потоком через все этапы, развернутые на пути эвакуации — это эвакуация:
- 1) «на себя»
 - 2) «по направлению»
 - 3) «от себя»
 - 4) «по назначению»
14. Эвтаназия — это

- 1) самоубийство
 - 2) искусственное прекращение жизни по желанию пациента
 - 3) естественная смерть
 - 4) отказ от лечения
15. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, относят к классу
- 1) в
 - 2) г
 - 3) б
 - 4) а
16. Куда помещают отходы класса А при их сборе?
- 1) в одноразовые пакеты или мешки
 - 2) в специальные пластиковые ёмкости предназначенные для этого
 - 3) в ящики с крышками с последующей утилизацией сжиганием
17. Одна из причин развития терминальных состояний
- 1) кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови
 - 2) хроническое заболевание желудка в стадии обострения
 - 3) стадия обострения или осложнения вирусного гепатита В
 - 4) декомпенсированный сахарный диабет
19. Живые вакцины подлежат хранению:
- 1) в термостате
 - 2) в холодильнике
 - 3) на складе при комнатной температуре
 - 4) в барокамере
20. К внешнему(вербальному) признаку ощущения пациентом боли относится:
- 1) напряженный лоб с появлением на нем глубоких морщин
 - 2) прекращение приема пищи
 - 3) отказ от общения
 - 4) заторможенность
21. Что относится к отходам класса Б?
- 1) материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств
 - 2) любые отходы и материалы, находящиеся на территории лечебного учреждения
 - 3) отходы больничного пищеблока, отходы палатные
22. Комплекс мероприятий, направленных на очищение дыхательных путей от слизи и мокроты
- 1) постановка горчичников на грудную клетку
 - 2) лечебная физкультура
 - 3) постуральный дренаж
23. Оптимальное положение пациента при коллапсе
- 1) приподнятый ножной конец
 - 2) полусидя на кушетке
 - 3) сидя на стуле
 - 4) приподнятый головной конец
24. Уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов является целью
- 1) дератизации
 - 2) стерилизации
 - 3) дезинсекции
 - 4) дезинфекции
25. Тест полоски на наличие кетоновых тел в моче используют при подозрении на
- 1) мочекаменную болезнь
 - 2) гломерулонефрит

- 3) сахарный диабет
 - 4) цистит и уретрит
26. Эвакуация пораженных своим транспортом на этапы медицинской эвакуации вышестоящего звена - это эвакуация
- 1) «от себя»
 - 2) «на себя»
 - 3) «по направлению»
 - 4) «по назначению»
27. Помощь пациенту при подозрении на острый аппендицит
- 1) введение анальгетиков
 - 2) введение антибактериальных средств
 - 3) холод на живот, госпитализация
 - 4) грелка на живот
28. «Золотым» стандартом кожных антисептиков являются
- 1) гелеобразные
 - 2) анионные
 - 3) спиртовые
 - 4) водные
29. К наиболее значимым факторам риска развития инсульта, инфаркта миокарда относятся:
- 1) вредные привычки (алкоголизм, табакокурение и др)
 - 2) артериальная гипертензия без коррекции лекарственными препаратами
 - 3) низкая физическая активность
 - 4) употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жира
30. Метод Геймлиха применяется для оказания первой помощи
- 1) при инфаркте миокарда
 - 2) при попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути
 - 3) при астматическом статусе
 - 4) при травме позвоночника
31. Симптом вывиха
- 1) крепитация
 - 2) изменение относительной длины конечности
 - 3) изменение абсолютной длины конечности
 - 4) патологическая подвижность в поврежденном суставе
32. Чрезвычайная ситуация локального уровня, если число пострадавших
- 1) 50-500 человек
 - 2) 1-10 человек
 - 3) более 500 пострадавших
 - 4) 10-50 человек
33. Заболевание, не относящееся к группе кишечных инфекций:
- 1) дизентерии
 - 2) сальмонеллеза
 - 3) холеры
 - 4) вирусного гепатита В
34. При выявлении чесотки пациента направляют к врачу
- 1) инфекционисту
 - 2) педиатру
 - 3) дерматологу
 - 4) аллергологу
35. Кома при передозировке инсулина
- 1) гипергликемическая
 - 2) гипогликемическая

- 3) уремиическая
 - 4) кетоацидотическая
36. Формированию вторичных половых признаков у девочек способствует гормон
- 1) пролактин
 - 2) тестостерон
 - 3) эстрадиол
 - 4) инсулин
37. При преимущественно умственном труде наиболее эффективной формой восстановления является:
- 1) чтение
 - 2) адекватная физическая нагрузка
 - 3) пассивный отдых
 - 4) потребление правильной пищи
38. Катетеризация мочевого пузыря у мужчин металлическим катетером выполняется
- 1) старшей медсестрой
 - 2) только медсестрой
 - 3) медсестрой и врачом
 - 4) врачом
39. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо ограничение соли в сутки до:
- 1) 3 г
 - 2) 10 г
 - 3) 6 г
 - 4) 5 г
40. Анатомическая область введения вакцины БЦЖ
- 1) граница верхней и средней трети наружной поверхности плеча
 - 2) граница верхней и средней трети внутренней поверхности плеча
 - 3) наружная поверхность предплечья
 - 4) внутренняя поверхность предплечья
41. Уборка процедурного кабинета, которая проводится 1 раз в 7 дней, в фиксированный день, по графику работы кабинета называется
- 1) генеральная
 - 2) заключительная
 - 3) стратегическая
 - 4) контактная
42. Листок нетрудоспособности выдается
- 1) после перенесения любого заболевания, любым человеком
 - 2) заболевшим лицам, работающим по трудовому договору
 - 3) лицам с хроническими заболеваниями или находящимся на диспансеризации
 - 4) работникам на время прохождения периодических медицинских осмотров
43. Чрезвычайная ситуация территориального уровня, если число пострадавших:
- 1) 1-10 человек
 - 2) 50-500 человек
 - 3) 10-50 человек
 - 4) более 500 пострадавших
44. Покраснение кожных покровов наблюдается при
- 1) отравлении угарным газом
 - 2) острой печеночной недостаточности
 - 3) алкогольной интоксикации
 - 4) атопическом дерматите
45. Механическая антисептика - это:
- 1) дренирование раны марлевым тампоном

- 2) удаление из раны нежизнеспособных тканей
 - 3) промывание раны раствором водорода пероксида
 - 4) наложение давящей повязки
46. Сколько уровней обработки рук обычно выделяют?
- 1) 3
 - 2) 2
 - 3) 1
47. Метеоризмом называют
- 1) спастические боли в кишечнике
 - 2) патологическое газообразование в кишечнике
 - 3) диарею более 3-5 раз в сутки
 - 4) задержку стула более 48 часов
48. Основная причина острого гломерулонефрита
- 1) кандидозная инфекция
 - 2) микобактерии
 - 3) кишечная палочка
 - 4) бета-гемолитический стрептококк группы А
49. При ожирении двигательную активность рекомендуют
- 1) увеличить
 - 2) уменьшить
 - 3) не изменять
 - 4) индивидуально дозировать
50. Доврачебная сестринская помощь пациенту с легочным кровотечением во время догоспитального периода
- 1) измерение температуры
 - 2) введение кровоостанавливающих препаратов
 - 3) подготовка набора для плевральной пункции
 - 4) холод на грудную клетку
51. Оптимальным сроком оказания первой помощи пострадавшим принято считать с момента поражения:
- 1) 6 часов
 - 2) 3 часа
 - 3) 1 час
 - 4) 20-30 минут
52. Способ транспортировки при ранении в затылок
- 1) в полусидящем положении
 - 2) лежа на животе
 - 3) лежа на боку
 - 4) лежа на спине с поворотом головы в здоровую сторону
53. Наиболее эффективным средством контрацепции, защищающим от заболеваний, передающихся половым путем, является
- 1) презерватив
 - 2) гормональные препараты
 - 3) дезинфекция после полового акта
 - 4) диафрагма
54. Диастолическое давление в норме у взрослого человека составляет _____ мм рт. Ст.
- 1) 140 – 160
 - 2) 60 – 80
 - 3) 20 – 40
 - 4) 100 – 120
55. Нитроглицерин при приступе стенокардии пациент принимает
- 1) сублингвально

- 2) per os, запивая небольшим количеством воды
 - 3) внутрь, запивая большим количеством воды
 - 4) препарат вводят подкожно
56. Препарат первой помощи при стенокардии
- 1) нифедипин
 - 2) нитроглицерин
 - 3) каптоприл
 - 4) верапамил
57. При любом инфекционном заболевании необходимо прежде всего провести дезинфекцию
- 1) одежды больного
 - 2) выделений больного
 - 3) посуды больного
 - 4) постельного белья
58. Шок при инфаркте миокарда
- 1) кардиогенный
 - 2) кардиологический
 - 3) анафилактический
 - 4) гемотрансфузионный
59. Неоказание медицинской помощи без уважительной причины человеку, нуждающемуся в ней – это:
- 1) должностной подлог
 - 2) преступление
 - 3) злоупотребление служебным положением
 - 4) нарушение прав потребителя
60. Для промывания желудка взрослому следует приготовить чистую воду (в л)
- 1) 3
 - 2) 0,5
 - 3) 1
 - 4) 10
61. Фактором, провоцирующим гипертонический криз является
- 1) резкое переохлаждение
 - 2) неправильное питание
 - 3) гиподинамия
 - 4) чрезмерное физическое и психическое перенапряжение
62. Шок при множественных переломах
- 1) кардиогенный
 - 2) анафилактический
 - 3) травматический (+)
 - 4) гемотрансфузионный
63. Цель проведения инфузионной терапии
- 1) переливание плазмы
 - 2) поддержание водно-электролитного баланса
 - 3) переливание эритроцитарной массы
 - 4) обезболивание
64. «Этический кодекс медицинской сестры России» принят
- 1) министерством здравоохранения РФ
 - 2) всемирной организацией здравоохранения
 - 3) международным советом медицинских сестер
 - 4) ассоциацией медицинских сестер России
65. Температура очистительной клизмы ___ градусов:
- 1) 25-30

- 2) 39-45
 - 3) 12-14
 - 4) 15-25
66. Риск микробного заражения у медперсонала возникает при контакте с инфицированными стерильными медицинскими изделиями
- 1) пациентами, секретами и выделениями пациентов, ранами и повязками
 - 2) расходным материалом
67. Отходы больничного пищеблока относят к классу
- 1) а
 - 2) г
 - 3) б
68. Сифонная клизма применяется при неопухолевой обтурационной кишечной непроходимости для
- 1) местного воздействия на слизистую прямой кишки при терапии
 - 2) терапии состояния обтурации (запора)
 - 3) перед постановкой лекарственной клизмы
 - 4) введения питательных веществ
69. Уборка процедурного кабинета, которая проводится в конце рабочего дня называется
- 1) генеральная
 - 2) заключительная
 - 3) текущая
 - 4) предварительная
70. В структуре причин установления инвалидности первое место занимают
- 1) заболевания органов дыхания
 - 2) травмы, несчастные случаи, отравления
 - 3) сердечно-сосудистые заболевания
 - 4) злокачественные образования
71. Прививки против гриппа проводят
- 1) выезжающим за границу страны
 - 2) больным гриппом
 - 3) переболевшим гриппом
 - 4) при угрозе эпидемии гриппа
72. Основная жалоба при обструктивном бронхите
- 1) недомогание
 - 2) одышка
 - 3) боль в груди
73. Сестринская помощь при кровотечении из бедренной артерии
- 1) применение гемостатической губки
 - 2) тампонада раны
 - 3) наложение артериального жгута выше места повреждения
 - 4) наложение давящей повязки
74. Признаки правильно наложенного кровоостанавливающего жгута
- 1) падение артериального давления
 - 2) чувство онемения в конечности
 - 3) прекращение кровотечения и онемение конечности
 - 4) прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферии конечности
75. Клиническими симптомами кардиогенного шока являются
- 1) приступ удушья, ортопноэ
 - 2) резкое повышение артериального давления, напряженный пульс
 - 3) лихорадка, рвота
 - 4) резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс

76. При отсутствии у пострадавшего сознания и наличии самостоятельного дыхания следует
- 1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение (+)
 - 1) подложить пострадавшему под голову валик из одежды
 - 2) подложить валик из одежды под плечи пострадавшего
77. Компетенция медицинской сестры во время приступа бронхиальной астмы у ребенка
- 1) проведение отвлекающих процедур
 - 2) оксигенотерапии
 - 3) введение антибиотиков
 - 4) введение эуфиллина внутривенно
78. Диастолическим давлением называется
- 1) артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца
 - 2) разница между систолическим и диастолическим давлением
 - 3) давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тону во время расслабления желудочков сердца
 - 4) сумма систолического и диастолического давления
79. Геронтология – это наука о
- 1) профилактике и лечении болезней старческого возраста
 - 2) здоровье женщины
 - 3) смерти
 - 4) старении
80. Медицинская помощь оказывается
- 1) спасателями с использованием табельных медицинских средств
 - 2) медицинскими работниками с использованием табельных медицинских средств
 - 3) населением с использованием подручных средств
 - 4) медицинскими работниками с использованием подручных средств

